

1. Gyakorlat - Megoldások

Középiskolai ismeretek ismétlése

F1. (Halmazműveletek). Lássuk be, hogy a következő halmazok esetén teljesül, hogy $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{C}$, $\mathbf{A} \neq \mathbf{C}$, $\mathbf{B} \cup \mathbf{C} = \mathbf{C}$, $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \{2, 10\}$, ahol

$$\mathbf{A} = \{1, 2, 10\}, \quad \mathbf{B} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 1\}, \quad \mathbf{C} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \geq 1\}.$$

Megoldás [F1]. $A \subseteq C$ mert $\forall a \in A$ -ra $a \in C$

$$1^2 = 1 \geq 1 \Rightarrow 1 \in C$$

$$2^2 = 4 \geq 1 \Rightarrow 2 \in C$$

$$10^2 = 100 \geq 1 \Rightarrow 10 \in C$$

De például $3^2 \geq 1$ szintén, miközben $3 \notin A$, így $A \neq C$. Ezért írhatjuk azt is, hogy $A \subset C$ valódi részhalmaz.

$B \cup C = C$ mivel $B \subset C$ belátható, hiszen $\forall b \in B$ -re $b \in C$

$$B = \{2, 3, 4, \dots\}$$

$$C = \{\dots, -2, -1, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$A \cap B = \{1, 2, 10\} \cap \{2, 3, 4, \dots\} = \{2, 10\}$, pontosan két elem van A -ban, ami B -ben is szerepel.

F2. (Egyenletek megoldása). Oldjuk meg $\mathbb{R}$ -en a következő egyenleteket és szemléltessük megoldáshalmazukat a számegyenesen:

$$(a) \quad x + 2 = \sqrt{4x + 13},$$

$$(b) \text{ (Hf)} \quad 3x = \sqrt{x + 3} + 1$$

$$(c) \quad \left| \frac{3x + 2}{x - 1} \right| = 3,$$

$$(d) \text{ (Hf)} \quad \left| \frac{x + 5}{2} \right| = 1.$$

Megoldás [F2]. (a) A gyökvonás miatt $4x + 13 \geq 0$, azaz $x \geq -13/4$. Az egyenletet négyzetre emelve esetleg hamis gyököket kaphatunk:

$$\begin{aligned}(x+2)^2 &= 4x+13 \\ x^2+4x+4 &= 4x+13 \quad / -4x-4 \\ x^2 &= 9 \\ x &= \pm 3\end{aligned}$$

Visszahelyettesítve ezeket az eredeti egyenletbe

$$\begin{aligned}5 &= 3+2 = \sqrt{4 \cdot 3 + 13} = \sqrt{25} = 5 \\ -1 &= -3+2 \neq \sqrt{4 \cdot (-3) + 13} = \sqrt{-12+13} = \sqrt{1} = 1\end{aligned}$$

azt kapjuk, hogy az $x = 3$ a helyes megoldás, az $x = -3$ nem megoldás.

(b) $x = 1$ megoldás, az $x = -2/9$ nem megoldás.

(c) Kikötjük, hogy $x - 1 \neq 0$, azaz $x \neq 1$. Egy szám abszolút értéke pontosan akkor 3, ha a szám -3 vagy $+3$. Tehát két eset van:

$$\begin{aligned}\frac{3x+2}{x-1} &= 3 \\ 3x+2 &= 3x-3 \quad / -3x \\ 2 &\neq -3\end{aligned}$$

azaz itt nincs megoldás, vagy

$$\begin{aligned}\frac{3x+2}{x-1} &= -3 \\ 3x+2 &= -3x+3 \quad / +3x-2 \\ 6x &= 1\end{aligned}$$

azaz $x = \frac{1}{6} (\neq 1)$ az egyetlen megoldás.

(d) $x = -3$ vagy $x = -7$.


F3. (Abszolútértékes egyenlőtlenség megoldása). Oldjuk meg $\mathbb{R}$ -en a következő egyenlőtlenséget, és szemléltessük a megoldáshalmazt a számegyenesen:

$$(a) \quad \left| \frac{x+2}{2} \right| \leq 3, \quad (b) \quad \left| \frac{2x}{3} + 5 \right| > 1.$$

Megoldás [F3]. (a) Egy szám abszolút értéke pontosan akkor legfeljebb 3, ha a szám -3 és 3 között van:

$$\begin{aligned} -3 &\leq \frac{x+2}{2} \leq 3 && / \cdot 2 \\ -6 &\leq x+2 \leq 6 && / -2 \\ -8 &\leq x \leq 4 \end{aligned}$$


tehát a megoldás: $x \in [-8, 4]$.



(b)

$$\begin{array}{lll} \frac{2x}{3} + 5 < -1 & & \frac{2x}{3} + 5 > 1 \\ \frac{2x}{3} < -6 & \text{vagy} & \frac{2x}{3} > -4 \\ 2x < -18 & & 2x > -12 \\ x < -9 & & x > -6 \end{array}$$

tehát a megoldás: $x \in (-\infty, -9) \cup (-6, \infty)$.



F4. (Egyenlőtlenségrendszer grafikus megoldása). Írjunk fel olyan egyenlőtlenségrendszert, melynek megoldáshalmaza az $A(0, 0)$, $B(0, 5)$ és $C(1, 3)$ csúcspontú háromszög belseje!


Megoldás [F4].

AB oldalegyenese az y -tengely, melynek egyenlete $x = 0$, ettől jobbra lévő pontok halmaza: $x > 0$.

AC oldalegyenes meredéksége $(3 - 0)/(1 - 0) = 3$ így az egyenlete $y = 3x + 0$ (átmegy az origón).

A háromszög belseje ezen egyenes felett van, így a megfelelő egyenlőtlenség: $y > 3x$.

A BC oldalegyenes meredéke -2 , így az egyenlete $y = -2x + 5$, mert az y -tengelyt az 5-nél metszi. A háromszög belseje ezen egyenes alatt van, így a megfelelő egyenlőtlenség: $y < -2x + 5$.



F5. (Körök és parabolák ábrázolása). Vázlatosan ábrázoljuk azon pontok mértani helyét a síkon, melyekre az alábbi egyenlőtlenségek egyszerre teljesülnek

$$x^2 + y^2 + 2y < 3 \quad \text{és} \quad y > x^2 - 2.$$

Megoldás [F5]. Az első egyenlőtlenséget teljes négyzetté alakítjuk:

$$x^2 + (y + 1)^2 - 1 < 3$$

$$x^2 + (y + 1)^2 < 4,$$


ami egy $(0, -1)$ középpontú, 2 sugarú kör belseje.

A második egyenlőtlenségénél először csak a határgörbét tekintsük:

$$y = x^2 - 2.$$

Ez egy parabola, melynek szimmetriatengelye az y -tengely. Csúcspontja az $x = 0$ behelyettesítéssel adódik $(0, -2)$. (A görbe x -tengellyel vett metszéspontjai az $(\pm\sqrt{2}, 0)$ koordinátájú pontok.)


Az egyenlőtlenséget kielégítő pontok a parabola belsejében helyezkednek el.



F6. (Hf) Vázlatosan ábrázoljuk azon pontok mértani helyét a síkon, melyekre az alábbi egyenlőtlenségek egyszerre teljesülnek

$$x^2 + y^2 \geq 4 \quad \text{és} \quad y < x^2 + 1.$$

Megoldás [F6].



Opcionális(ha marad idő)

F7. (Teljes indukció). Bizonyítsuk be teljes indukcióval minden $n > 0$ egész számra, hogy

$$\sum_{k=1}^n 2k - 1 = n^2.$$

Megoldás [F7]. Ha $n = 1$

$$\sum_{k=1}^1 2k - 1 = 1.$$

Ha $n = 2$

$$\sum_{k=1}^2 2k - 1 = 1 + 3 = 4 = 2^2.$$

Tegyük fel $n = N$ -re igaz, azaz

$$\sum_{k=1}^N 2k - 1 = N^2 \quad (\text{indukciós feltétel})$$

Vizsgáljuk $n = N + 1$ -re

$$\sum_{k=1}^{N+1} 2k - 1 = \sum_{k=1}^N 2k - 1 + 2(N + 1) - 1 \underset{(\text{ind.felt.})}{=} N^2 + 2N + 1 = (N + 1)^2.$$

F8. (Indirekt bizonyítás). Igazoljuk, hogy $\sqrt{5}$ irracionális szám.

Megoldás [F8]. Tegyük fel indirekt, hogy $\sqrt{5}$ racionális, ekkor $\exists p, q \in \mathbb{Z}$, úgy hogy $\sqrt{5} = p/q$.

Legyen p és q olyan pozitív egész, hogy a tört tovább már nem egyszerűsíthető (azaz nincs közös osztójuk). Ekkor

$$\begin{aligned} \sqrt{5} &= p/q & / \cdot q \\ \sqrt{5} \cdot q &= p & / \text{az egyenletet négyzetre emeljük, hisz } p, q > 0 \\ 5q^2 &= p^2 & / : 25 \quad \text{ekkor } p\text{-nek osztója kell legyen az } 5, \text{ tehát } r = p/5 \text{ egész} \\ \frac{q^2}{5} &= r^2 \end{aligned}$$

és mivel a jobb oldalon egész szám áll, ezért $\frac{q^2}{5}$ is egész szám kell, hogy legyen, tehát q -nak is

osztója az 5. Így találtunk egy közös osztót p -re és q -ra, ami ellentmond annak, hogy p/q tovább nem egyszerűsíthető. Ezért az eredeti feltevésünk hamis kell, hogy legyen.