

# 1. Gyakorlat - Megoldások

## Középiskolai ismeretek ismétlése

**F1. (Halmazműveletek).** Lássuk be, hogy a következő halmazok esetén teljesül, hogy  $\mathbf{A} \subseteq \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{A} \neq \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{B} \cup \mathbf{C} = \mathbf{C}$ ,  $\mathbf{A} \cap \mathbf{B} = \{2, 10\}$ , ahol

$$\mathbf{A} = \{1, 2, 10\}, \quad \mathbf{B} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 1\}, \quad \mathbf{C} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \geq 1\}.$$

**Megoldás [F1].**  $A \subseteq C$  mert  $\forall a \in A$ -ra  $a \in C$

$$1^2 = 1 \geq 1 \Rightarrow 1 \in C$$

$$2^2 = 4 \geq 1 \Rightarrow 2 \in C$$

$$10^2 = 100 \geq 1 \Rightarrow 10 \in C$$

De például  $3^2 \geq 1$  szintén, miközben  $3 \notin A$ , így  $A \neq C$ . Ezért írhatjuk azt is, hogy  $A \subset C$  valódi részhalmaz.

$B \cup C = C$  mivel  $B \subset C$  belátható, hiszen  $\forall b \in B$ -re  $b \in C$

$$B = \{2, 3, 4, \dots\}$$

$$C = \{\dots, -2, -1, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

$A \cap B = \{1, 2, 10\} \cap \{2, 3, 4, \dots\} = \{2, 10\}$ , pontosan két elem van  $A$ -ban, ami  $B$ -ben is szerepel.

**F2. (Egyenletek megoldása).** Oldjuk meg  $\mathbb{R}$ -en a következő egyenleteket és szemléltessük megoldáshalmazukat a számegyenesen:

$$(a) \quad x + 2 = \sqrt{4x + 13},$$

$$(b) \text{ (Hf)} \quad 3x = \sqrt{x + 3} + 1$$

$$(c) \quad \left| \frac{3x + 2}{x - 1} \right| = 3,$$

$$(d) \text{ (Hf)} \quad \left| \frac{x + 5}{2} \right| = 1.$$

**Megoldás [F2].** (a) A gyökvonás miatt  $4x + 13 \geq 0$ , azaz  $x \geq -13/4$ . Az egyenletet négyzetre emelve esetleg hamis gyököket kaphatunk:

$$\begin{aligned}(x + 2)^2 &= 4x + 13 \\ x^2 + 4x + 4 &= 4x + 13 & / - 4x - 4 \\ x^2 &= 9 \\ x &= \pm 3\end{aligned}$$

Visszahelyettesítve ezeket az eredeti egyenletbe

$$\begin{aligned}5 &= 3 + 2 = \sqrt{4 \cdot 3 + 13} = \sqrt{25} = 5 \\ -1 &= -3 + 2 \neq \sqrt{4 \cdot (-3) + 13} = \sqrt{-12 + 13} = \sqrt{1} = 1\end{aligned}$$

azt kapjuk, hogy az  $x = 3$  a helyes megoldás, az  $x = -3$  nem megoldás.

(b)  $x = 1$  megoldás, az  $x = -2/9$  nem megoldás.

(c) Kikötjük, hogy  $x - 1 \neq 0$ , azaz  $x \neq 1$ . Egy szám abszolút értéke pontosan akkor 3, ha a szám  $-3$  vagy  $+3$ . Tehát két eset van:

$$\begin{aligned}\frac{3x + 2}{x - 1} &= 3 \\ 3x + 2 &= 3x - 3 & / - 3x \\ 2 &\neq -3\end{aligned}$$

azaz itt nincs megoldás, vagy

$$\begin{aligned}\frac{3x + 2}{x - 1} &= -3 \\ 3x + 2 &= -3x + 3 & / + 3x - 2 \\ 6x &= 1\end{aligned}$$

azaz  $x = \frac{1}{6} (\neq 1)$  az egyetlen megoldás.

(d)  $x = -3$  vagy  $x = -7$ .


**F3. (Abszolútértékes egyenlőtlenség megoldása).** Oldjuk meg  $\mathbb{R}$ -en a következő egyenlőtlenséget, és szemléltessük a megoldáshalmazt a számegyenesen:

$$(a) \quad \left| \frac{x+2}{2} \right| \leq 3, \quad (b) \quad \left| \frac{2x}{3} + 5 \right| > 1.$$

**Megoldás [F3].** (a) Egy szám abszolút értéke pontosan akkor legfeljebb 3, ha a szám  $-3$  és  $3$  között van:

$$\begin{aligned} -3 &\leq \frac{x+2}{2} \leq 3 && / \cdot 2 \\ -6 &\leq x+2 \leq 6 && / -2 \\ -8 &\leq x \leq 4 \end{aligned}$$


tehát a megoldás:  $x \in [-8, 4]$ .



(b)

$$\begin{aligned} \frac{2x}{3} + 5 &< -1 && \frac{2x}{3} + 5 > 1 \\ \frac{2x}{3} &< -6 && \text{vagy} && \frac{2x}{3} > -4 \\ 2x &< -18 && && 2x > -12 \\ x &< -9 && && x > -6 \end{aligned}$$

tehát a megoldás:  $x \in (-\infty, -9) \cup (-6, \infty)$ .



**F4. (Egyenlőtlenségrendszer grafikus megoldása).** Írjunk fel olyan egyenlőtlenségrendszert, melynek megoldáshalmaza az  $A(0, 0)$ ,  $B(0, 5)$  és  $C(1, 3)$  csúcspontú háromszög belseje!


**Megoldás [F4].**

$AB$  oldalegyenese az  $y$ -tengely, melynek egyenlete  $x = 0$ , ettől jobbra lévő pontok halmaza:  $x > 0$ .

$AC$  oldalegyenes meredéksége  $(3 - 0)/(1 - 0) = 3$  így az egyenlete  $y = 3x + 0$  (átmegy az origón).

A háromszög belseje ezen egyenes felett van, így a megfelelő egyenlőtlenség:  $y > 3x$ .

A  $BC$  oldalegyenes meredéksége  $-2$ , így az egyenlete  $y = -2x + 5$ , mert az  $y$ -tengelyt az 5-nél metszi. A háromszög belseje ezen egyenes alatt van, így a megfelelő egyenlőtlenség:  $y < -2x + 5$ .



**F5. (Körök és parabolák ábrázolása).** Vázlatosan ábrázoljuk azon pontok mértani helyét a síkon, melyekre az alábbi egyenlőtlenségek egyszerre teljesülnek

$$x^2 + y^2 + 2y < 3 \quad \text{és} \quad y > x^2 - 2.$$

**Megoldás [F5].** Az első egyenlőtlenséget teljes négyzetté alakítjuk:

$$x^2 + (y + 1)^2 - 1 < 3$$

$$x^2 + (y + 1)^2 < 4,$$


ami egy  $(0, -1)$  középpontú, 2 sugarú kör belseje.

A második egyenlőtlenségénél először csak a határgörbét tekintjük:

$$y = x^2 - 2.$$

Ez egy parabola, melynek szimmetriatengelye az  $y$ -tengely. Csúcspontja az  $x = 0$  behelyettesítéssel adódik  $(0, -2)$ . (A görbe  $x$ -tengellyel vett metszéspontjai az  $(\pm\sqrt{2}, 0)$  koordinátájú pontok.)


Az egyenlőtlenséget kielégítő pontok a parabola belsejében helyezkednek el.



**F6. (Hf)** Vázlatosan ábrázoljuk azon pontok mértani helyét a síkon, melyekre az alábbi egyenlőtlenségek egyszerre teljesülnek

$$x^2 + y^2 \geq 4 \quad \text{és} \quad y < x^2 + 1.$$

Megoldás [ F6 ].



Opcionális(ha marad idő)

**F7. (Teljes indukció).** Bizonyítsuk be teljes indukcióval minden  $n > 0$  egész számra, hogy

$$\sum_{k=1}^n 2k - 1 = n^2.$$

**Megoldás [F7].** Ha  $n = 1$

$$\sum_{k=1}^1 2k - 1 = 1.$$

Ha  $n = 2$

$$\sum_{k=1}^2 2k - 1 = 1 + 3 = 4 = 2^2.$$

Tegyük fel  $n = N$ -re igaz, azaz

$$\sum_{k=1}^N 2k - 1 = N^2 \quad (\text{indukciós feltétel})$$

Vizsgáljuk  $n = N + 1$ -re

$$\sum_{k=1}^{N+1} 2k - 1 = \sum_{k=1}^N 2k - 1 + 2(N + 1) - 1 \stackrel{(\text{ind.felt.})}{=} N^2 + 2N + 1 = (N + 1)^2.$$

**F8. (Indirekt bizonyítás).** Igazoljuk, hogy  $\sqrt{5}$  irracionális szám.

**Megoldás [F8].** Tegyük fel indirekt, hogy  $\sqrt{5}$  racionális, ekkor  $\exists p, q \in \mathbb{Z}$ , úgy hogy  $\sqrt{5} = p/q$ .

Legyen  $p$  és  $q$  olyan pozitív egész, hogy a tört tovább már nem egyszerűsíthető (azaz nincs közös osztójuk). Ekkor

$$\begin{aligned} \sqrt{5} &= p/q & / \cdot q \\ \sqrt{5} \cdot q &= p & / \text{az egyenletet négyzetre emeljük, hisz } p, q > 0 \\ 5q^2 &= p^2 & / : 25 \quad \text{ekkor } p\text{-nek osztója kell legyen az } 5, \text{ tehát } r = p/5 \text{ egész} \\ \frac{q^2}{5} &= r^2 \end{aligned}$$

és mivel a jobb oldalon egész szám áll, ezért  $\frac{q^2}{5}$  is egész szám kell, hogy legyen, tehát  $q$ -nak is

osztója az 5. Így találtunk egy közös osztót  $p$ -re és  $q$ -ra, ami ellentmond annak, hogy  $p/q$  tovább nem egyszerűsíthető. Ezért az eredeti feltevésünk hamis kell, hogy legyen.