

8. Gyakorlat

Konvexitás, Aszimptoták, L'Hospital-szabály

F1. (Konvexitás) Adjuk meg azokat az intervallumokat, amelyeken az f függvény konvex, illetve konkáv. Van-e a függvénynek inflexiós pontja?

(a) $f(x) = 2x^3 - 21x^2 + 36x$,

(b) $f(x) = \frac{x^3}{x-1}$,

(c) **(Hf)** $f(x) = xe^{-5x}$.

F2. (Aszimptoták) Van-e az f függvénynek aszimptotája? Ha igen, akkor határozzuk meg az aszimptota egyenesének egyenletét!

(a) $f(x) = \frac{x^2 + 9}{x}$,

(b) $f(x) = x^3 - x^2 - 2x$,

(c) $f(x) = \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 + 1}$,

(d) $f(x) = \sqrt{4x^2 + 3x + 1}$,

(e) **(Hf)** $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

F3. (L'Hospital-szabály) A L'Hospital-szabály alkalmazásával számítsuk ki az alábbi határértékeket. Azt is állapítsuk meg, hogy milyen típusú kritikus határértékről van szó.

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(2x - 4)}{\operatorname{tg}(x - 2)}$,

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{3x}$,

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(x) - x}{x - \sin(x)}$,

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.