

# Függvénysorok

Matematika A2 műszaki menedzser

2020 tavasz

## Bevezetés

	$\mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$	$\mathbb{N} \mapsto (\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R})$
Jelölés:	$n \mapsto a_n$	$n \mapsto f_n(x)$
Név:	sorozat ✓	függvénysorozat
Összegezve:	numerikus sor ✓	függvénysor

## Bevezetés

	$\mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$	$\mathbb{N} \mapsto (\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R})$
Jelölés:	$n \mapsto a_n$	$n \mapsto f_n(x)$
Név:	sorozat ✓	függvénysorozat
Összegezve:	numerikus sor ✓	függvénysor

A  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  numerikus sorban a számokat kicseréljük függvényekere:  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ .

## Bevezetés

	$\mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$	$\mathbb{N} \mapsto (\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R})$
Jelölés:	$n \mapsto a_n$	$n \mapsto f_n(x)$
Név:	sorozat ✓	függvénysorozat
Összegezve:	numerikus sor ✓	függvény-sor

A  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  numerikus sorban a számokat kicseréljük függvényekere:  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ .

Ez az összeg bizonyos  $x$ -re konvergens, bizonyos  $x$ -re nem az.

## Definíció

Legyen  $f_n(x)$  függvények egy sorozata, ekkor az  $S_N(x) := \sum_{n=1}^N f_n(x)$  függvényt *részletösszeg-függvénynek* nevezzük.

## Bevezetés

	$\mathbb{N} \mapsto \mathbb{R}$	$\mathbb{N} \mapsto (\mathbb{R} \mapsto \mathbb{R})$
Jelölés:	$n \mapsto a_n$	$n \mapsto f_n(x)$
Név:	sorozat ✓	függvénysorozat
Összegezve:	numerikus sor ✓	függvény-sor

A  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  numerikus sorban a számokat kicseréljük függvényekere:  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$ .

Ez az összeg bizonyos  $x$ -re konvergens, bizonyos  $x$ -re nem az.

## Definíció

Legyen  $f_n(x)$  függvények egy sorozata, ekkor az  $S_N(x) := \sum_{n=1}^N f_n(x)$

függvényt *részletösszeg-függvénynek* nevezzük. Az  $f_n(x)$

függvénysorozathoz tartozó *függvény-sornak* nevezzük a  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  összeget.

# Konvergenciatartomány

## Definíció

A  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  függvénysor *konvergenciatartománya* azon  $x \in \mathbb{R}$ -ek halmaza, melyre  $S_N(x)$  sorozat konvergens és  $F(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$  határérték lesz a sor *összegfüggvénye*.

# Konvergenciatartomány

## Definíció

A  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  függvénysor *konvergenciatartománya* azon  $x \in \mathbb{R}$ -ek halmaza, melyre  $S_N(x)$  sorozat konvergens és  $F(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$  határérték lesz a sor összegfüggvénye.

1. példa Vizsgáljuk meg az  $f_n(x) = x^n$  függvénysorozat részletösszeg-függvényét és a konvergenciatartományát.

# Konvergeniatartomány

## Definíció

A  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  függvénysor *konvergeniatartománya* azon  $x \in \mathbb{R}$ -ek halmaza, melyre  $S_N(x)$  sorozat konvergens és  $F(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$  határérték lesz a sor összegfüggvénye.

1. példa Vizsgáljuk meg az  $f_n(x) = x^n$  függvénysorozat részletösszeg-függvényét és a konvergeniatartományát.

Rögzített  $x$ -re ez egy mértani sor  $x$  kvócienssel, ezért

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N x^n = x \frac{1 - x^N}{1 - x}, \text{ ami } |x| < 1 \text{ esetén konvergens, ha } N \rightarrow \infty.$$



# Konvergeniatartomány

## Definíció

A  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  függvénysor *konvergeniatartománya* azon  $x \in \mathbb{R}$ -ek halmaza, melyre  $S_N(x)$  sorozat konvergens és  $F(x) := \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$  határérték lesz a sor összegfüggvénye.

1. példa Vizsgáljuk meg az  $f_n(x) = x^n$  függvénysorozat részletösszeg-függvényét és a konvergeniatartományát.

Rögzített  $x$ -re ez egy mértani sor  $x$  kvócienssel, ezért

$$S_N(x) = \sum_{n=1}^N x^n = x \frac{1 - x^N}{1 - x}, \text{ ami } |x| < 1 \text{ esetén konvergens, ha } N \rightarrow \infty.$$

Ekkor viszont  $\lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \frac{x}{1 - x}$  lesz a  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$  függvénysor összegfüggvénye

és  $I = (-1, 1)$  lesz a konvergeniatartomány.

# Hatványsorok

## Definíció

A  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  alakú függvénysorokat *hatványsornak* nevezzük. Az  $x_0$  a hatványsor középpontja és  $a_n$  az együtthatósorozat.

# Hatványsorok

## Definíció

A  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  alakú függvénysorokat *hatványsornak* nevezzük. Az  $x_0$  a hatványsor középpontja és  $a_n$  az együtthatósorozat.

**Kérdés:** Milyen  $x \in \mathbb{R}$  esetén lesz a hatványsor konvergens?

# Hatványsorok

## Definíció

A  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  alakú függvénysorokat *hatványsornak* nevezzük. Az  $x_0$  a hatványsor középpontja és  $a_n$  az együtthatósorozat.

**Kérdés:** Milyen  $x \in \mathbb{R}$  esetén lesz a hatványsor konvergens?

Ha  $x$  értékét lerögzítjük, akkor ez már egy numerikus sor, mert nincs benne változó és így alkalmazhatjuk rá a gyökkritériumot:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = |x - x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Leftrightarrow |x - x_0| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

# Hatványsorok

## Definíció

A  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  alakú függvénysorokat *hatványsornak* nevezzük. Az  $x_0$  a hatványsor középpontja és  $a_n$  az együtthatósorozat.

**Kérdés:** Milyen  $x \in \mathbb{R}$  esetén lesz a hatványsor konvergens?

Ha  $x$  értékét lerögzítjük, akkor ez már egy numerikus sor, mert nincs benne változó és így alkalmazhatjuk rá a gyökkritériumot:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x - x_0)^n|} = |x - x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \Leftrightarrow |x - x_0| < \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}$$

Vagy akár a hányadoskritériumot:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x - x_0)^{n+1}}{a_n(x - x_0)^n} \right| = |x - x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \Leftrightarrow |x - x_0| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

# Cauchy-Hadamard-tétel

## Tétel

A  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  hatványsor konvergenciasugara

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

A hatványsor az  $(x_0 - r, x_0 + r)$  intervallumon konvergens, míg az  $[x_0 - r, x_0 + r]$  intervallumon kívül divergens.

# Cauchy-Hadamard-tétel

## Tétel

A  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  hatványsor konvergenciasugara

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

A hatványsor az  $(x_0 - r, x_0 + r)$  intervallumon konvergens, míg az  $[x_0 - r, x_0 + r]$  intervallumon kívül divergens.

Ha  $r = 0$ , akkor csak  $x_0$ -ban konvergens a hatványsor, ha  $r = \infty$ , akkor minden  $x \in \mathbb{R}$ -re konvergens.

A tétel következménye, hogy a hatványsor konvergenciatartománya egy intervallum, melynek középpontja  $x_0$ , hossza pedig  $2r$ . A végpontokban külön meg kell vizsgálni a konvergenciát a gyök-és hányadoskritériumokban lévő  $q = 1$  esetén fellépő bizonytalanság miatt. Ez két numerikus sor vizsgálat, ahol már nem használható a fenti két kritérium.

## Példa

2. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^n n}$  sor konvergenciáját.



## Példa

2. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^n n}$  sor konvergenciáját.

Leolvasható a középpontja és együtthatósorozata:  $x_0 = 3$ ,  $a_n = \frac{1}{2^n n}$ .

## Példa

2. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^n n}$  sor konvergenciáját.

Leolvasható a középpontja és együtthatósorozata:  $x_0 = 3$ ,  $a_n = \frac{1}{2^n n}$ .

Első lépésként állapítsuk meg a konvergenciasugarat, melyhez használjuk a gyökkritériumot:  $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{2^n n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sqrt[n]{n} = 2$ .

## Példa

2. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^n n}$  sor konvergenciáját.

Leolvasható a középpontja és együtthatósorozata:  $x_0 = 3$ ,  $a_n = \frac{1}{2^n n}$ .

Első lépésként állapítsuk meg a konvergenciasugarat, melyhez használjuk a gyökkritériumot:  $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{2^n n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sqrt[n]{n} = 2$ .

A Cauchy-Hadamard-tétel miatt  $(3 - 2, 3 + 2) = (1, 5)$  intervallumon belül konvergens, míg az  $[1, 5]$  intervallumon kívül divergens.

## Példa

2. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^n n}$  sor konvergenciáját.

Leolvasható a középpontja és együtthatósorozata:  $x_0 = 3$ ,  $a_n = \frac{1}{2^n n}$ .

Első lépésként állapítsuk meg a konvergenciasugarat, melyhez használjuk a gyökkritériumot:  $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{2^n n}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n n} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sqrt[n]{n} = 2$ .

A Cauchy-Hadamard-tétel miatt  $(3 - 2, 3 + 2) = (1, 5)$  intervallumon belül konvergens, míg az  $[1, 5]$  intervallumon kívül divergens. Ha

$$x = 1, \text{ akkor } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-3)^n}{2^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^n n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}, \text{ ami Leibniz}$$

típusú, tehát véges, így az 1 benne van a konvergenciatartományban.

## Példa

2. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^{2^n}}$  sor konvergenciáját.

Leolvasható a középpontja és együtthatósorozata:  $x_0 = 3$ ,  $a_n = \frac{1}{2^{2^n}}$ .

Első lépésként állapítsuk meg a konvergenciasugarat, melyhez használjuk a gyökkritériumot:  $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{2^{2^n}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\sqrt[n]{2^n}} = 2$ .

A Cauchy-Hadamard-tétel miatt  $(3-2, 3+2) = (1, 5)$  intervallumon belül konvergens, míg az  $[1, 5]$  intervallumon kívül divergens. Ha

$$x = 1, \text{ akkor } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-3)^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}, \text{ ami Leibniz}$$

típusú, tehát véges, így az 1 benne van a konvergenciatartományban.

$$x = 5, \text{ akkor } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5-3)^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ harmonikus sor, ami}$$

divergens, így az 5 nincs benne a konvergenciatartományban.

## Példa

2. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{2^{2^n}}$  sor konvergenciáját.

Leolvasható a középpontja és együtthatósorozata:  $x_0 = 3$ ,  $a_n = \frac{1}{2^{2^n}}$ .

Első lépésként állapítsuk meg a konvergenciasugarat, melyhez használjuk a gyökkritériumot:  $r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a_n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{2^{2^n}}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^{2^n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} 2^{\sqrt[n]{2^n}} = 2$ .

A Cauchy-Hadamard-tétel miatt  $(3-2, 3+2) = (1, 5)$  intervallumon belül konvergens, míg az  $[1, 5]$  intervallumon kívül divergens. Ha

$$x = 1, \text{ akkor } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1-3)^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}, \text{ ami Leibniz}$$

típusú, tehát véges, így az 1 benne van a konvergenciatartományban.

$$x = 5, \text{ akkor } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5-3)^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{2^{2^n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ harmonikus sor, ami}$$

divergens, így az 5 nincs benne a konvergenciatartományban.

Tehát a fenti sor konvergens, ha  $x \in [1, 5)$ .

## Példa

3. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2}$  sor konvergenciáját.

## Példa

3. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} x^n$  átalakítás után látszik, hogy  $a_n = \frac{3^n}{n^2}$  és  $x_0 = 0$ .



## Példa

3. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} x^n$  átalakítás után látszik, hogy  $a_n = \frac{3^n}{n^2}$  és  $x_0 = 0$ .

Ezúttal alkalmazzuk a hányadostesztet:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n}{n^2}}{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n (n+1)^2}{3 \cdot 3^n n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{3n^2} = \frac{1}{3}$$

## Példa

3. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} x^n$  átalakítás után látszik, hogy  $a_n = \frac{3^n}{n^2}$  és  $x_0 = 0$ .

Ezúttal alkalmazzuk a hányadosesztet:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n}{n^2}}{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n (n+1)^2}{3 \cdot 3^n n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{3n^2} = \frac{1}{3}$$

A Cauchy-Hadamard-tétel miatt  $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$  intervallumon belül konvergens, míg az  $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$  intervallumon kívül divergens.

## Példa

3. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} x^n$  átalakítás után látszik, hogy  $a_n = \frac{3^n}{n^2}$  és  $x_0 = 0$ .

Ezúttal alkalmazzuk a hányadostesztet:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n}{n^2}}{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n (n+1)^2}{3 \cdot 3^n n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{3n^2} = \frac{1}{3}$$

A Cauchy-Hadamard-tétel miatt  $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$  intervallumon belül konvergens, míg az  $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$  intervallumon kívül divergens.

Ha  $x = \pm \frac{1}{3}$ , akkor  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} \left(\pm \frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pm 1)^n}{n^2}$ , de ez a sor abszolút konvergens, így a  $\pm \frac{1}{3}$  benne van a konvergenciatartományban.

## Példa

3. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} x^n$  átalakítás után látszik, hogy  $a_n = \frac{3^n}{n^2}$  és  $x_0 = 0$ .

Ezúttal alkalmazzuk a hányadostesztet:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{3^n}{n^2}}{\frac{3^{n+1}}{(n+1)^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n (n+1)^2}{3 \cdot 3^n n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{3n^2} = \frac{1}{3}$$

A Cauchy-Hadamard-tétel miatt  $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$  intervallumon belül konvergens, míg az  $[-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$  intervallumon kívül divergens.

Ha  $x = \pm \frac{1}{3}$ , akkor  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} \left(\pm \frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\pm 1)^n}{n^2}$ , de ez a sor abszolút konvergens, így a  $\pm \frac{1}{3}$  benne van a konvergenciatartományban.

Tehát a fenti sor konvergens, ha  $x \in [-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}]$ .

## Példa

4. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{n!}$  sor konvergenciáját.

## Példa

4. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{n!}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} (x-3)^n$  átalakítás után látszik, hogy

$$a_n = \frac{(-2)^n}{n!} \text{ és } x_0 = 3.$$

## Példa

4. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{n!}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} (x-3)^n$  átalakítás után látszik, hogy

$$a_n = \frac{(-2)^n}{n!} \text{ és } x_0 = 3.$$

Ezúttal alkalmazzuk a hányadostesztet:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-2)^n}{n!}}{\frac{(-2)^{n+1}}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-2)^n (n+1)n!}{(-2)(-2)^n n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{-2} \right| = \infty$$

## Példa

4. példa Vizsgáljuk meg a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{n!}$  sor konvergenciáját.

A  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(6-2x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} (x-3)^n$  átalakítás után látszik, hogy

$$a_n = \frac{(-2)^n}{n!} \text{ és } x_0 = 3.$$

Ezúttal alkalmazzuk a hányadostesztet:

$$r = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-2)^n}{n!}}{\frac{(-2)^{n+1}}{(n+1)!}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-2)^n (n+1)n!}{(-2)(-2)^n n!} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n+1}{-2} \right| = \infty$$

Mivel a konvergenciasugár végtelen, ezért ez a hatványsor minden  $x \in \mathbb{R}$  esetén konvergens.



# Hatványsor deriválása és integrálása

## Tétel

Az  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  hatványsor konvergenciatartományának

belsejében a tagonkénti deriválásával kapott  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n n(x - x_0)^{n-1}$  hatványsor is konvergens ugyanazon az intervallumon és  $f'(x)$ -el egyezik meg.

# Hatványsor deriválása és integrálása

## Tétel

Az  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  hatványsor konvergenciatartományának

belsejében a tagonkénti deriválásával kapott  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n n(x - x_0)^{n-1}$  hatványsor is konvergens ugyanazon az intervallumon és  $f'(x)$ -el egyezik meg.

## Tétel

Az  $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$  hatványsor konvergenciatartományának bármely

belső  $[a, b]$  intervallumában tagonként integrálható, azaz

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n(x - x_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} [(x - x_0)^{n+1}]_a^b.$$

# Függvényből hatványsor

**Kérdés:** Hogyan számol a számológép (például) trigonometrikus függvényeket?

# Függvényből hatványsor

**Kérdés:** Hogyan számol a számítógép (például) trigonometrikus függvényeket?

**Válasz:** Nem pontosan számol, csak közelít, de hogyan csináljuk, ha csak alpműveletek vannak?

# Függvényből hatványsor

**Kérdés:** Hogyan számol a számológép (például) trigonometrikus függvényeket?

**Válasz:** Nem pontosan számol, csak közelít, de hogyan csináljuk, ha csak alpműveletek vannak?

**Cél:** Megadott függvények felírása hatványsor alakban ( $a_n = ?$ ) úgy, hogy minden derivált megegyezzen a 0-ban.

$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots$	$f(0) = a_0$	$a_0 := f(0)$
$f'(x) = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots$	$f'(0) = a_1$	$a_1 := f'(0)$
$f''(x) = 2a_2 + 6a_3x + \dots$	$f''(0) = 2a_2$	$a_2 := \frac{f''(0)}{2}$
$f'''(x) = 6a_3 + \dots$	$f'''(0) = 6a_3$	$a_3 := \frac{f'''(0)}{6}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
$f^{(n)}(x) = \dots$	$f^{(n)}(0) = n!a_n$	$a_n := \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$

# Maclaurin-sor, Taylor-sor

## Definíció

Legyen az  $f(x)$  függvény a  $0$  egy környezetében tetszőlegesen sokszor differenciálható, ekkor  $f(x)$  **Maclaurin-során** a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$  függvénysort értjük.

# Maclaurin-sor, Taylor-sor

## Definíció

Legyen az  $f(x)$  függvény a  $0$  egy környezetében tetszőlegesen sokszor differenciálható, ekkor  $f(x)$  **Maclaurin-során** a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$  függvényt értjük.

Előfordulhat, hogy a kitüntetett középpont nem a  $0$ :

## Definíció

Legyen az  $f(x)$  függvény az  $x_0$  egy környezetében tetszőlegesen sokszor differenciálható, ekkor  $f(x)$  **Taylor-során** a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$  függvényt értjük.

# Maclaurin-sor, Taylor-sor

## Definíció

Legyen az  $f(x)$  függvény a  $0$  egy környezetében tetszőlegesen sokszor differenciálható, ekkor  $f(x)$  **Maclaurin-során** a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$  függvényt értjük.

Előfordulhat, hogy a kitüntetett középpont nem a  $0$ :

## Definíció

Legyen az  $f(x)$  függvény az  $x_0$  egy környezetében tetszőlegesen sokszor differenciálható, ekkor  $f(x)$  **Taylor-során** a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$  függvényt értjük.

A Taylor-sor felírása után ellenőriznünk kell, hogy a hatványsor konvergencia-e és előállítja-e a megadott függvényt.



# Példa

5. példa Írjuk fel az  $f(x) = e^x$  függvény Maclauren-sorát.

# Példa

5. példa Írjuk fel az  $f(x) = e^x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$f(x) = e^x \quad f(0) = 1$$

## Példa

5. példa Írjuk fel az  $f(x) = e^x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^x & f(0) &= 1 \\ f'(x) &= e^x & f'(0) &= 1 \end{aligned}$$

## Példa

5. példa Írjuk fel az  $f(x) = e^x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll} f(x) = e^x & f(0) = 1 \\ f'(x) = e^x & f'(0) = 1 \\ f''(x) = e^x & f''(0) = 1 \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

## Példa

5. példa Írjuk fel az  $f(x) = e^x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll}
 f(x) = e^x & f(0) = 1 \\
 f'(x) = e^x & f'(0) = 1 \\
 f''(x) = e^x & f''(0) = 1 \\
 \vdots & \vdots \\
 f^{(n)}(x) = e^x & f^{(n)}(0) = 1
 \end{array}$$

## Példa

5. példa Írjuk fel az  $f(x) = e^x$  függvény Maclaren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll} f(x) = e^x & f(0) = 1 \\ f'(x) = e^x & f'(0) = 1 \\ f''(x) = e^x & f''(0) = 1 \\ \vdots & \vdots \\ f^{(n)}(x) = e^x & f^{(n)}(0) = 1 \end{array}$$

Ebből felírható, hogy a Maclaren-sor:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

## Példa

5. példa Írjuk fel az  $f(x) = e^x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll}
 f(x) = e^x & f(0) = 1 \\
 f'(x) = e^x & f'(0) = 1 \\
 f''(x) = e^x & f''(0) = 1 \\
 \vdots & \vdots \\
 f^{(n)}(x) = e^x & f^{(n)}(0) = 1
 \end{array}$$

Ebből felírható, hogy a Maclauren-sor:

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

Ennek a hatványsornak a konvergenciasugara végtelen, azaz minden  $x \in \mathbb{R}$ -re konvergens és elő is állítja a függvényt.

# Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclauren-sorát.



# Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$f(x) = \sin x \quad f(0) = 0$$

# Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x & f(0) &= 0 \\ f'(x) &= \cos x & f'(0) &= 1 \end{aligned}$$

# Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x & f(0) &= 0 \\ f'(x) &= \cos x & f'(0) &= 1 \\ f''(x) &= -\sin x & f''(0) &= 0 \end{aligned}$$

## Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclaren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$f(x) = \sin x \quad f(0) = 0$$

$$f'(x) = \cos x \quad f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\sin x \quad f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -\cos x \quad f'''(0) = -1$$

## Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll}
 f(x) = \sin x & f(0) = 0 \\
 f'(x) = \cos x & f'(0) = 1 \\
 f''(x) = -\sin x & f''(0) = 0 \\
 f'''(x) = -\cos x & f'''(0) = -1 \\
 f^{(4)}(x) = \sin x & f^{(4)}(0) = 0 \\
 \vdots & \vdots
 \end{array}$$

## Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclauren-sorát. Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll}
 f(x) = \sin x & f(0) = 0 \\
 f'(x) = \cos x & f'(0) = 1 \\
 f''(x) = -\sin x & f''(0) = 0 \\
 f'''(x) = -\cos x & f'''(0) = -1 \\
 f^{(4)}(x) = \sin x & f^{(4)}(0) = 0 \\
 \vdots & \vdots
 \end{array}$$

Látható, hogy inentől kezdve periodikusan ismétlődnek a deriváltak és minden második 0, és ami nem 0, az  $\pm 1$  felváltva. Ebből felírható, hogy a Maclauren-sor:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$$

## Példa

6. példa Írjuk fel az  $f(x) = \sin x$  függvény Maclauren-sorát. Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll}
 f(x) = \sin x & f(0) = 0 \\
 f'(x) = \cos x & f'(0) = 1 \\
 f''(x) = -\sin x & f''(0) = 0 \\
 f'''(x) = -\cos x & f'''(0) = -1 \\
 f^{(4)}(x) = \sin x & f^{(4)}(0) = 0 \\
 \vdots & \vdots
 \end{array}$$

Látható, hogy inentől kezdve periodikusan ismétlődnek a deriváltak és minden második 0, és ami nem 0, az  $\pm 1$  felváltva. Ebből felírható, hogy a Maclauren-sor:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$$

Ennek a hatványsornak a konvergenciasugara végtelen, azaz minden  $x \in \mathbb{R}$ -re konvergens és elő is állítja a függvényt.

# Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát.



# Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$f(x) = \cos x \quad f(0) = 1$$

# Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f(0) &= 1 \\ f'(x) &= -\sin x & f'(0) &= 0 \end{aligned}$$

# Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f(0) &= 1 \\ f'(x) &= -\sin x & f'(0) &= 0 \\ f''(x) &= -\cos x & f''(0) &= -1 \end{aligned}$$

# Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f(0) &= 1 \\ f'(x) &= -\sin x & f'(0) &= 0 \\ f''(x) &= -\cos x & f''(0) &= -1 \\ f'''(x) &= \sin x & f'''(0) &= 0 \end{aligned}$$

## Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát.  
Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll}
 f(x) = \cos x & f(0) = 1 \\
 f'(x) = -\sin x & f'(0) = 0 \\
 f''(x) = -\cos x & f''(0) = -1 \\
 f'''(x) = \sin x & f'''(0) = 0 \\
 f^{(4)}(x) = \cos x & f^{(4)}(0) = 1 \\
 \vdots & \vdots
 \end{array}$$

## Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát. Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll} f(x) = \cos x & f(0) = 1 \\ f'(x) = -\sin x & f'(0) = 0 \\ f''(x) = -\cos x & f''(0) = -1 \\ f'''(x) = \sin x & f'''(0) = 0 \\ f^{(4)}(x) = \cos x & f^{(4)}(0) = 1 \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

Látható, hogy inentől kezdve periodikusan ismétlődnek a deriváltak és minden második 0, és ami nem 0, az  $\pm 1$  felváltva. Ebből felírható, hogy a Maclauren-sor:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$$

## Példa

7. példa Írjuk fel az  $f(x) = \cos x$  függvény Maclauren-sorát. Vizsgáljuk meg az első néhány deriváltat:

$$\begin{array}{ll} f(x) = \cos x & f(0) = 1 \\ f'(x) = -\sin x & f'(0) = 0 \\ f''(x) = -\cos x & f''(0) = -1 \\ f'''(x) = \sin x & f'''(0) = 0 \\ f^{(4)}(x) = \cos x & f^{(4)}(0) = 1 \\ \vdots & \vdots \end{array}$$

Látható, hogy inentől kezdve periodikusan ismétlődnek a deriváltak és minden második 0, és ami nem 0, az  $\pm 1$  felváltva. Ebből felírható, hogy a Maclauren-sor:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$$

Ennek a hatványsornak a konvergenciasugara végtelen, azaz minden  $x \in \mathbb{R}$ -re konvergens és elő is állítja a függvényt.

# Alapfüggvények Maclauren-sora

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$



# Alapfüggvények Maclauren-sora

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

# Alapfüggvények Maclauren-sora

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

# Alapfüggvények Maclauren-sora

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \forall x \in (-1, 1)$$

# Taylor-és Maclauren-sorba fejtés

A megadott függvény adott pont körüli sorfejtéséhez az alábbi technikák használhatóak:

Deriválgatás: Csak az alapfüggvényekre használtuk, inentől **NEM** lesz rá szükség, **NE HASZNÁLJUK!**

# Taylor-és Maclauren-sorba fejtés

A megadott függvény adott pont körüli sorfejtéséhez az alábbi technikák használhatóak:

Deriválás: Csak az alapfüggvényekre használtuk, inentől **NEM** lesz rá szükség, **NE HASZNÁLJUK!**

Átalakítás: Algebrai átalakításokkal, változók helyettesítésével visszavezetjük a megadott függvényt valamilyen ismert alapfüggvényre.

## Taylor-és Maclauren-sorba fejtés

A megadott függvény adott pont körüli sorfejtéséhez az alábbi technikák használhatóak:

Deriválgatás: Csak az alapfüggvényekre használtuk, inentől NEM lesz rá szükség, NE HASZNÁLJUK!

Átalakítás: Algebrai átalakításokkal, változók helyettesítésével visszavezetjük a megadott függvényt valamilyen ismert alapfüggvényre.

Deriválás, integrálás: A megadott függvény deriváltja/integrálja valamilyen alapfüggvény, vagy arra algebrailag visszavezethető függvény, majd sorbafejtés után visszaintegráljuk/deriváljuk.

## Taylor-és Maclauren-sorba fejtés

A megadott függvény adott pont körüli sorfejtéséhez az alábbi technikák használhatóak:

Deriválgatás: Csak az alapfüggvényekre használtuk, inentől NEM lesz rá szükség, NE HASZNÁLJUK!

Átalakítás: Algebrai átalakításokkal, változók helyettesítésével visszavezetjük a megadott függvényt valamilyen ismert alapfüggvényre.

Deriválás, integrálás: A megadott függvény deriváltja/integrálja valamilyen alapfüggvény, vagy arra algebrailag visszavezethető függvény, majd sorbafejtés után visszaintegráljuk/deriváljuk.

Minden sorfejtéshez hozzá tartozik a konvergenciaintervallum megállapítása is, melyet az alapfüggvény konvergenciaintervallumából vezetünk le.

# Példák

8. példa Fejtsük sorba az alábbi függvényeket a 0 körül:

a)  $e^{3x} =$



## Példák

8. példa Fejtsük sorba az alábbi függvényeket a 0 körül:

$$\text{a) } e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n, \quad 3x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$\text{b) } xe^{-2x} =$$

## Példák

8. példa Fejtsük sorba az alábbi függvényeket a 0 körül:

$$\text{a) } e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n, \quad 3x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$\text{b) } xe^{-2x} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2x)^n}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^{n+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\text{c) } \cos(x^2) =$$

## Példák

8. példa Fejtsük sorba az alábbi függvényeket a 0 körül:

$$\text{a) } e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n, \quad 3x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$\text{b) } xe^{-2x} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2x)^n}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^{n+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\text{c) } \cos(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x^2)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{4n}, \quad x^2 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$\text{d) } \frac{\sin(5x)}{x} =$$

## Példák

8. példa Fejtsük sorba az alábbi függvényeket a 0 körül:

$$a) e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n, \quad 3x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$b) xe^{-2x} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2x)^n}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^{n+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$c) \cos(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x^2)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{4n}, \quad x^2 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$d) \frac{\sin(5x)}{x} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (5x)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$e) \frac{x^2}{4+x} =$$

## Példák

8. példa Fejtsük sorba az alábbi függvényeket a 0 körül:

$$a) e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3x)^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n}{n!} x^n, \quad 3x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$b) xe^{-2x} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2x)^n}{n!} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n!} x^{n+1}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$c) \cos(x^2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} (x^2)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{4n}, \quad x^2 \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$$

$$d) \frac{\sin(5x)}{x} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} (5x)^{2n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 5^{2n+1}}{(2n+1)!} x^{2n}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$e) \frac{x^2}{4+x} = \frac{x^2}{4} \frac{1}{1+\frac{x}{4}} = \frac{x^2}{4} \frac{1}{1-\left(-\frac{x}{4}\right)} = \frac{x^2}{4} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{x}{4}\right)^n =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} x^{n+2}, \quad \text{ha } \left|-\frac{x}{4}\right| < 1 \Leftrightarrow |x| < 4, \text{ azaz } x \in (-4, 4).$$

# Példa

9. példa Fejtsük sorba az  $f(x) = \ln(1 + x)$  függvényt a 0 körül:

## Példa

9. példa Fejtsük sorba az  $f(x) = \ln(1+x)$  függvényt a 0 körül:  
A sorfejtéshez a derivált függvényt fogjuk használni:

$$f(x) = \ln(1+x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x}$$

$$\frac{1}{1+x} = \frac{1}{1-(-x)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \Rightarrow$$

$$\int f'(x) dx = f(x) + c = \int \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \int (-1)^n x^n dx \right) =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}, \text{ ha } |-x| < 1 \Leftrightarrow x \in (-1, 1) \text{ és } c = -f(0) = 0$$

Igazából  $x = 1$ -re visszkapjuk a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$  sort, ami Leibniz-sor, tehát

konvergens, ezért a fenti sor konvergens, ha  $x \in (-1, 1]$ . Ekkor  $x = 1$ -re:

$$\ln(1+1) = \ln(2) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

# Példa

10. példa Fejtsük sorba az  $f(x) = \arctan(x)$  függvényt a 0 körül:



## Példa

10. példa Fejtsük sorba az  $f(x) = \arctan(x)$  függvényt a 0 körül:  
A sorfejtéshez a derivált függvényt fogjuk használni:

$$f(x) = \arctan(x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\frac{1}{1+x^2} = \frac{1}{1-(-x^2)} = \sum_{n=0}^{\infty} (-x^2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \Rightarrow$$

$$\int f'(x) dx = f(x) + c = \int \left( \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \right) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \left( \int (-1)^n x^{2n} dx \right) =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \text{ ha } |-x^2| < 1 \Leftrightarrow x \in (-1, 1) \text{ és } c = -f(0) = 0$$

Igazából  $x = 1$ -re visszkapjuk a  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$  sort, ami Leibniz-sor, tehát

konvergens, ezért a fenti sor konvergens, ha  $x \in (-1, 1]$ . Ekkor  $x = 1$ -re:

$$\arctan(1) = \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

# Közelítések hatványsorok segítségével

**Feladat:** Közelítsük meg alkalmas hatványsor segítségével az  $\ln 2$ -öt.

## Közelítések hatványsorok segítségével

**Feladat:** Közelítsük meg alkalmas hatványsor segítségével az  $\ln 2$ -öt. Ehhez az  $f(x) = \ln(1+x)$  függvény  $x_0 = 0$  körüli sorfejtését használjuk az  $x = 1$  helyen:

## Közelítések hatványsorok segítségével

**Feladat:** Közelítsük meg alkalmas hatványsor segítségével az  $\ln 2$ -öt. Ehhez az  $f(x) = \ln(1+x)$  függvény  $x_0 = 0$  körüli sorfejtését használjuk az  $x = 1$  helyen:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \Rightarrow \ln(1+1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$


Ennek a sorfejtésnek a konvergenciaintervallumában benne van az 1.

# Közelítések hatványsorok segítségével

**Feladat:** Közelítsük meg alkalmas hatványsor segítségével az  $\ln 2$ -öt. Ehhez az  $f(x) = \ln(1+x)$  függvény  $x_0 = 0$  körüli sorfejtését használjuk az  $x = 1$  helyen:

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \Rightarrow \ln(1+1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$$

Ennek a sorfejtésnek a konvergenciaintervallumában benne van az 1.



# Közelítés Leibniz-sorokra

## Tétel

$$\text{Ha } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = A \text{ és } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ Leibniz-sor, akkor } \left| \sum_{n=0}^N a_n - A \right| < |a_{N+1}|.$$

# Közelítés Leibniz-sorokra

## Tétel

$$\text{Ha } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = A \text{ és } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ Leibniz-sor, akkor } \left| \sum_{n=0}^N a_n - A \right| < |a_{N+1}|.$$

Tehát a közelítés hibáját mindig az összegezendő sorozat következő elemével lehet felülről becsülni.

$$\text{Tehát az } \ln 2 \text{ esetében a hiba: } \epsilon = \left| \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{n+1} - \ln 2 \right| < \left| \frac{(-1)^n}{N+2} \right| = \frac{1}{N+2},$$

ami egy elég lassú konvergencia, de a sor konvergenciaintervallumának legszélén vagyunk, ezért ez nem is olyan meglepő.

# Közelítés Leibniz-sorokra

## Tétel

$$\text{Ha } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = A \text{ és } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ Leibniz-sor, akkor } \left| \sum_{n=0}^N a_n - A \right| < |a_{N+1}|.$$

Tehát a közelítés hibáját mindig az összegezendő sorozat következő elemével lehet felülről becsülni.

$$\text{Tehát az } \ln 2 \text{ esetében a hiba: } \epsilon = \left| \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{n+1} - \ln 2 \right| < \left| \frac{(-1)^n}{N+2} \right| = \frac{1}{N+2},$$

ami egy elég lassú konvergencia, de a sor konvergenciaintervallumának legszélén vagyunk, ezért ez nem is olyan meglepő.

**Kérdés:** Hány tagig kell elmennünk, hogy az  $\ln 2$  értékét két tizedesjegy pontossággal megközelítsük?



# Közelítés Leibniz-sorokra

## Tétel

$$\text{Ha } \sum_{n=0}^{\infty} a_n = A \text{ és } \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ Leibniz-sor, akkor } \left| \sum_{n=0}^N a_n - A \right| < |a_{N+1}|.$$

Tehát a közelítés hibáját mindig az összegezendő sorozat következő elemével lehet felülről becsülni.

$$\text{Tehát az } \ln 2 \text{ esetében a hiba: } \epsilon = \left| \sum_{n=0}^N \frac{(-1)^n}{n+1} - \ln 2 \right| < \left| \frac{(-1)^n}{N+2} \right| = \frac{1}{N+2},$$

ami egy elég lassú konvergencia, de a sor konvergenciaintervallumának legszélén vagyunk, ezért ez nem is olyan meglepő.

**Kérdés:** Hány tagig kell elmennünk, hogy az  $\ln 2$  értékét két tizedesjegy pontossággal megközelítsük?

**Válasz:** Ha a valódi hiba ( $\epsilon$ ) felső becslése ( $\frac{1}{N+2}$ ) is eleget tesz a fenti feltételnek, akkor a valódi hiba is. A két tizedesjegy pontosság azt jelenti, hogy  $\epsilon < 10^{-2}$ , amiből  $\frac{1}{N+2} < 10^{-2} \Leftrightarrow N+2 > 10 \Leftrightarrow N > 98$ .

# Taylor-tétel

**Kérdés:** Mi a helyzet, ha nem tudunk Leibniz-sorra hivatkozni egy adott függvény adott értékének közelítésénél?

# Taylor-tétel

**Kérdés:** Mi a helyzet, ha nem tudunk Leibniz-sorra hivatkozni egy adott függvény adott értékének közelítésénél?

## Definíció

Legyen az  $f(x)$  függvény az  $x_0$  egy környezetében legalább  $N$ -szer differenciálható, ekkor  $f(x)$   $N$ -edfokú *Taylor-polinomján* a

$$T_{f, x_0}^N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ polinomot értjük.}$$

# Taylor-tétel

**Kérdés:** Mi a helyzet, ha nem tudunk Leibniz-sorra hivatkozni egy adott függvény adott értékének közelítésénél?

## Definíció

Legyen az  $f(x)$  függvény az  $x_0$  egy környezetében legalább  $N$ -szer differenciálható, ekkor  $f(x)$   $N$ -edfokú *Taylor-polinomján* a

$$T_{f, x_0}^N(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \text{ polinomot értjük.}$$

## Tétel

Legyen az  $f(x)$  függvény az  $x_0$  egy környezetében legalább  $N + 1$ -szer differenciálható, ekkor

$$f(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} = T_{f, x_0}^N(x) + L_{f, x_0}^N(t),$$

ahol  $t \in (x_0, x)$  és  $L_{f, x_0}^N(t)$  az úgynevezett Lagrange-féle maradtéktag.

## Közelítés Taylor-polinommal

Az előző tétel értelmében tehát egy adott szám közelítéséhez használhatjuk a Taylor-polinomot és a hiba felülről becsülhető a Lagrange-féle maradéktaggal.

# Közelítés Taylor-polinommal

Az előző tétel értelmében tehát egy adott szám közelítéséhez használhatjuk a Taylor-polinomot és a hiba felülről becsülhető a Lagrange-féle maradéktaggal.

11. példa Közelítsük  $e$  értékét 3 tizedesjegy pontossággal. ( $e \approx 2.71828$ )

## Közelítés Taylor-polinommal

Az előző tétel értelmében tehát egy adott szám közelítéséhez használhatjuk a Taylor-polinomot és a hiba felülről becsülhető a Lagrange-féle maradéktaggal.

**11. példa** Közelítsük  $e$  értékét 3 tizedesjegy pontossággal. ( $e \approx 2.71828$ )

Használjuk az  $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$  0-körüli Taylor sorból az első  $N$  tagot és

helyettesítsük be az  $x$  helyére az 1-et, ekkor  $e \approx \sum_{n=0}^N \frac{1}{n!}$  és a hiba

$\epsilon = \left| e - T_{e^x, 0}^N(1) \right| = \left| L_{e^x, 0}^N(t) \right|$ , ahol  $t \in (0, 1)$ . Becsüljük a hibát:

$$\left| L_{e^x, 0}^N(t) \right| = \left| \frac{(e^x)^{(N)}(t)}{(N+1)!} (1-0)^{N+1} \right| = \frac{e^t}{(N+1)!} < \frac{e}{(N+1)!} < \frac{4}{(N+1)!} < 10^{-3}$$

ha  $4000 < (N+1)!$ , ami már  $N = 6$ -ra igaz ( $7! = 5040$ ).

$$\text{Tehát } e \approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} = \frac{1957}{720} = 2,71805 \cdot$$